

Pontuação de Miopatia Peitoral (BM)

Os diagramas de BM abaixo indicam a localização e a gravidade de algumas das miopatias mencionadas no Manual de miopatias em frangos de corte. O sistema de pontuação mostrado nesses diagramas é apenas para fins de pesquisa e investigação: as pontuações não mostram os critérios de classificação da carne de peito no abatedouro.

Peito amadeirado


Pontuação 0

Normal, não parece duro em nenhuma parte do peito.




Pontuação 1

Uma área dura que afeta não mais do que aproximadamente 30 % do peito em qualquer área (superior, média ou inferior).




Pontuação 2

Uma área dura encontrada em duas partes do peito (superior e média ou média e inferior) ou uma área de dureza que representa aproximadamente 50 % a 60 % do peito, ou dureza que afeta todo o peito, mas o peito ainda pode ser flexionado em sua parte central.



Pontuação 3

Dureza que afeta todo o peito com perda de flexibilidade em sua parte central. Em alguns casos, pode estar esbranquiçado, fluido viscoso e/ou áreas hemorrágicas na superfície.



Peito totalmente comprometido

Áreas normais do peito mostradas em rosa e áreas afetadas em bege.

Pontuação de Miopatia Peitoral (BM)

Os diagramas de BM abaixo indicam a localização e a gravidade de algumas das miopatias mencionadas no Manual de miopatias em frangos de corte. O sistema de pontuação mostrado nesses diagramas é apenas para fins de pesquisa e investigação: as pontuações não mostram os critérios de classificação da carne de peito no abatedouro.

Estriações musculares

Pontuação 0

Normal, sem estrias em nenhuma seção do peito.



Pontuação 1

Estrias visíveis cobrindo aproximadamente 30 % da superfície do peito.




Pontuação 2

Estrias finas perceptíveis (<2 mm/0.08 in) que cobrem toda a superfície do peito, ou algumas linhas mais grossas (3-4 mm/0.12-0.16 in) que cobrem aproximadamente 40 % do peito.



Pontuação 3

Cobertura extensa do peito com uma mistura de estrias grossas (3-4 mm/0.12-0.16 in) e finas (<2 mm/0.08 in).



Pontuação de Miopatia Peitoral (BM)

Os diagramas de BM abaixo indicam a localização e a gravidade de algumas das miopatias mencionadas no Manual de miopatias em frangos de corte. O sistema de pontuação mostrado nesses diagramas é apenas para fins de pesquisa e investigação: as pontuações não mostram os critérios de classificação da carne de peito no abatedouro.

Fibrosa e esponjosa


Pontuação 0

Peito normal, sem sinais de fibrose ou estrutura esponjosa.



Pontuação 1

Uma área de fibras peitorais abertas que afeta até 30 % do peito em qualquer área (superior, média ou inferior), ou uma área que pode ser comprimida e ficando com uma prega, representando aproximadamente 40 % a 50 % da carne do peito.



Pontuação 2

Duas áreas do peito que apresentam áreas alteradas com fibras expostas, ou uma área que apresenta danos graves com fibras expostas afetando >50 % da superfície.

